

针灸治疗水牛泄泻的探讨

姚鑫*,王金海

(曲靖市会泽县者海镇畜牧兽医站,者海镇 654200)

摘要:治疗水牛泄泻采用针灸法简便易行,安全方便,治愈率高,经济实惠,本文介绍了详细诊法,供初学者及生产者参考。

关键词:针灸;水牛;泄泻

水牛泄泻是一种常见的多发病。笔者已用针灸治疗黄牛泄泻共 132 例,治愈 125 头,治愈率达 94.7%,在此基础上,尝试采用此法治疗水牛,目前已治疗 63 例,其中 39 例 1 次治愈,8 例用穿心莲注射液穴位注射 1 次治愈,10 例针灸配合药物 2 次治愈 6 头,2 例针灸配合药物治疗 5 次痊愈,死亡 4 头,治愈率达 93.6%。现将治疗方法介绍如下,仅供参考。

1 选穴与针法

1.1 选穴

主穴为胃俞、脾俞、交巢。配穴为关元俞、百会、后三里、带脉、尾本。

1.2 针法

寒泻者火针胃俞(双侧)、交巢、后三里(双侧),各留针 3 至 5 分钟。热泻者水针穿心莲注射液入胃俞(双侧)、交巢,放带脉、尾本血,也可单用火针关元俞(双侧)、交巢、不留针,放带脉、尾本血。根据病情对脱水者适当补液。虚泻(包括脾虚泄泻、肾虚泄)者火针胃俞(双侧)、交巢、百会、后三里(双侧),视病情配合补中益气、温肾涩肠中药内服及补液。不痢者用穿心莲注入胃俞(双侧)、交巢,火针后三里(双侧)不留针,配合加减白头翁

汤内服。

2 病例

2.1 1 头母水牛,7.5 岁,约 270kg,膘情中上,到农户家上门诊治。主诉该牛长期拉稀,食欲时好时坏。症见尾部附有粪迹,触诊角耳脊均凉,行走迟缓,精神稍见沉郁,体温 37.9℃,诊断为寒泻。火针胃俞(双侧)、交巢、后三里(双侧),各留针 3min。次日畜主电话报称病牛拉粪已成堆,吃草增加,精神好转,继续观察不给药。

2.2 1 头母水牛,10 岁,体重约 300kg,腹泻如水带渣,杂有黄豆至鸽蛋大带血的胶状物,卧地不安,不食,到农户家上门诊治。断为热泻。第一天火针胃俞(双侧)、交巢、后三里(双侧)不留针,放尾本血,第二、三天火针脾俞、胃俞、关元俞(前 2 穴加大肠俞为六脉,各穴的作用与效果基本相同,但每天每次只针刺 1 穴,双侧为 1 组,第三天夜间选隔穴),交巢不留针、放带脉、尾本血。并嘱畜主灌服加减白头翁汤(白头翁 40g、广木香 15g、苦参 30g、黄连 15g、穿心莲 30g),水煎 1 次灌服。4 日后该牛吃草大增,开始反刍,粪软成堆。

2.3 1 头公水牛,6 岁,膘情中下,牵来兽医站就治,主诉该牛平日常拉稀,食青草后更严

* 作者简介:姚鑫(1967 -),男,汉族,专科,兽医师。

重,吃草少,起立困难。症见该牛体质瘦削,眼眶深陷,喜卧,牵行摇晃,尾及后腿、肚腹有粪迹,体温 37.5°C ,诊为虚泻。火针胃俞(双侧)、交巢、百会、后三里(双侧)。配备补中益气丸,让畜主灌服,每次12粒,每天2次,连服3d。3日后到农户家上门复诊,该牛精神食欲好转,能自动走出在菜地上食青草,拉粪已成形。

2.4 1头4岁小水母牛,体重150kg,膘情中等。主诉称日前曾到过菜地吃过青菜等,后见吃草少,不反刍。症见鼻镜干燥,不反刍,精神沉郁,体温 39.8°C ,粪稀稠,初步诊断为下痢。选胃俞(双侧)、交巢,注入穿心莲20mL,并放山根、尾尖血。1d后病牛开始吃草、反刍恢复,鼻镜有汗珠,拉粪基本正常。

3 体会

对水牛的泄泻也可按辨证论治施于火

针、水针、血针等不同针法,是依据中兽医理论“虚则补之、实则泄之、寒则留之、热则疾之、陷下则灸之,不盛不虚以经取之”的原则,既对实热之证当用速针刺法以泻,虚之证宜留针之法以补,虚而致经气下陷的需用灸法以促其升举,既不属实证而又非单纯虚证的复杂病证,只有据经脉来推断,应用脏腑之间的互生互制的特点,或先补后泻,或补泻兼施,选其一经或数经的俞穴进行复式针法来处理。一般就针法来说:针刺强度越大为泻,中等强度为平补平泻,刺激小为补;一般认为火针为补,血针为泻;留针为补,速进速出针为泻;火针采用穿心莲穴位注射,加强了穴位刺激应属泻的范围,同时穿心莲对胃肠内多种兰氏阴性菌有较强的抗菌作用,一举两得,加强了穴位刺激效果,对急性腹泻或下痢症的治疗是适宜的。