

农村猪便秘的原因及防治措施

王明东*

(德宏州盈江县畜牧兽医局,盈江 679300)

摘要:对农村猪便秘的病因和治疗进行了总结,并提出了合理的综合防治措施。

关键词:母猪,便秘、病因、防治措施。

1 母猪便秘及主要症状

猪便秘是由于肠蠕动迟缓,粪便蓄积在肠腔内,肠内容物停滞、变硬,造成肠腔完全阻塞且以腹痛为主的疾病。主要症状是:病猪食欲减退或不食,腹部臃胀,起卧不安,频频做排粪动作,但难以排出,或仅排出少量带血丝粘液的干硬的粪球,肠音消失。

2 病因

在农村猪发生便秘的原因很多,按其病因,可分为原发性便秘和继发性便秘两种。原发性便秘主要由饲养管理不当引起,主要常由以下情况原因引发。

2.1 饲料单一,如长期饲喂粗纤维含量过多、干硬不易消化的劣质饲料,如稻谷糠,被抽过米皮的粗糠(谷壳),细米糠,干红薯藤,豆秸等,这些饲料不易被消化,容易在肠道内滞留易引起便秘。

2.2 母猪饲料缺乏合理科学的搭配,如精料过多或粗饲料过少,导致对胃肠的刺激弱,导致胃肠蠕动迟缓,诱发便秘。**③饲养管理不当,**如缺乏足够的饮水、运动量不足;突然更换饲料引起胃肠应激反应,或长期饲喂霉败变质的饲料等情况也极易诱发便秘。

2.3 母猪肠便秘常继发于某些发热性或热源性疾病。**①由热源性疾病引起,**如:在盈江高温高湿的夏季,由于管理不当,猪舍建造不科学,厩舍及环境卫生条件差等致使母猪中暑、感冒发热而引起便秘。**②没有做好常发疫病的预防注射工作,**如猪瘟、猪蓝耳、弓形体病、附红细胞体等发热性疾病的预防,母猪易患以上各种疾病,发病后病猪体温升高,导致体液散失或自身的调节功能失衡而发生便秘。**③特别是分娩母猪,**在分娩后机体极度虚弱,肠胃蠕动减慢也会引起肠便秘。

3 治疗

本病的治疗应以疏通肠管为主,镇痛、强心及对症治疗为辅。

3.1 结合临床症状选用清热通便类药物,如清热解毒通便液、双黄连、板兰根、穿心莲、新斯的明注射液等药物配合抗菌素类药物使用,可收到较好的疗效。

3.2 对于继发性便秘在积极治疗原发性疾病的同时,还应进行对症治疗可以收较好的治疗效果,如出现腹痛不安等症状的,可选用30%安乃近注射液,10~20ml肌肉注射;出现心脏衰弱时,可用10%安钠咖5~10ml,皮下或肌注;高度衰弱时,用10%葡萄糖250

* 作者简介:王明东(1981-),男,汉族,盈江县人,大专,助理畜牧兽医师,主要从事畜牧兽医技术工作。

~500ml + 维 c5ml + 硫酸庆大霉素 5 ml 静滴,每日1次。

3.3 对于分娩后的母猪,可选用清热解毒通便散、硫酸钠(镁)30~100g/次,加入适量温水内服。或内服菜籽油250~500g。用肥皂水灌肠,并配合腹部按摩效果很好

4 预防措施

在农村猪发生便秘的原因多因饲养管理不当和不注重防疫引起。在预防上应注意以下几个问题。

4.1 合理搭配饲草料,加强饲养管理。根据猪不同生长阶段的营养需要合理搭配饲料,均衡供给能量、蛋白、矿物质、维生素饲料,控

制好饲喂量,确保猪群的健康生长。合理搭配精、粗饲料比例。

4.2 做好猪舍及周边环境的卫生,如圈内粪便定时清扫,并清除排污沟里的粪便、杂物,保证污水的顺利排放,或定时添加或更换垫料。定时对料槽和饮水槽进行清洗和消毒,供以充足清洁的饮水。每隔15天用20%石灰乳液、消毒灵对猪舍及周围环境消毒1次。

4.3 强化防疫工作,按时接种猪瘟、猪蓝耳病、猪肺疫等常见疾病的疫苗,预防传染性疾病的发生。

4.4 积极做好猪舍的防寒、防暑工作。