

中医治疗牛普通咳嗽病初探

刘浩恩*

(楚雄州大姚县石羊镇畜牧兽医站,石羊镇 675402)

摘要:牛普通咳嗽病是牛肺经病患主要症状之一,多系外感和内伤所致,本人在二十九年临床实践中运用中兽医基础理论进行辨证施治,获满意疗效。现将辨证施治方法总结如下,供同行参考。

关键词:牛;普通咳嗽;中兽医

牛普通咳嗽病是牛肺经病患主要症状之一,多系外感和内伤所致,本人在二十九年临床实践中运用中西医基础理论进行辨证施治,获满意疗效。

1 统计资料

据处方统计,从1976年至2009年本人收治的146头普通咳嗽病病牛中,公牛36头(黄公牛30头,水公牛6头),母牛110头(黄母牛94头,水母牛16头),年龄最大的18岁,最小的65日龄,多是2~9岁,经治疗、治愈139头,显效2头,好转3头,无效2头。

2 辨证分型

牛普通咳嗽病一般由外感和内伤引起。外感引起的有风寒咳嗽和风热咳嗽;内伤引起的有肺虚、脾虚、肾虚、肺脾双虚和肺肾双虚等咳嗽,具体有以下几种:

2.1 外感型

2.1.1 风寒咳嗽

为风寒侵袭所致,患畜表现营养不良、形体消瘦、食欲不振、精神委靡,时冷时热、偶伴恶寒、鼻流清涕、无汗,咳嗽,唇鼻凉,口温偏低,舌苔薄白,脉象浮紧。病初不易被畜主察

觉,往往造成失治或延治,膘情中下等的成年牛和幼牛,在冬春气候多变的季节易患此症。

2.1.2 风热咳嗽

平素食欲欠佳,毛焦体瘦的牛在气候多变季节易发生此症。病中往往身微热,鼻液粘稠,咳嗽声小或微有“偷咳”,鼻镜干燥,反刍减少,口渴喜饮,口色赤红,口温偏高,舌苔薄黄,脉象浮数。

2.2 内伤型

2.2.1 肺虚咳嗽

患牛神态不佳,食欲减退,时而发热,经常咳嗽,不耐风寒,鼻液粘稠,口干舌燥,口色赤红,舌面无苔或有薄白苔,脉象细数。

2.2.2 脾虚咳嗽

多见于幼畜及老年牛。慢草或停食精神倦怠,有时喜饮,肚腹虚胀,粪多稀溏;口色淡白,舌苔薄白,脉象沉缓。

2.2.3 肾虚咳嗽

以成年公牛特别是未阉割的公牛多见,但犊牛也有发病者。咳则气喘,呼多吸少,静则无汗无咳,动则有鼻汗、咳甚。口温偏低,口色淡白,舌无苔,脉象虚浮,未阉割的成年公牛多不表现性行为。

* 作者简介:刘浩恩(1956-),男,汉族,中专,兽医师。

2.2.4 肺脾双虚

长期咳嗽,咳声频数,细弱无力,鼻液清稀,有时肚腹虚胀,粪便稀薄,倦怠喜卧,口色淡白,舌无苔,脉象细弱。

2.2.5 肺肾双虚

年龄稍大且体质瘦弱的牛易患此证。咳而气短,食欲减退,毛焦体瘦,干咳无力,日轻夜重;咳则收腹、拱背;静则咳嗽轻、鼻汗少或多而不成珠,动则咳嗽重、汗多粘性,口色淡白,舌面无苔,脉象细弱。

3 治疗

3.1 风寒咳嗽

治宜散寒解表、化痰止咳。方用杏苏散(苦杏仁、紫苏、桔梗、炒枳壳、前胡、荆芥穗、薄荷、黄芩、甘草)加味。表证重者加桂枝(孕牛可用细辛代);咳而微喘者,加桑白皮,赤茯苓,且以枇杷叶(去毛)为引,达宣肺止咳平喘之功。食欲不佳者,加炒三仙,对冬季无汗的患牛,加炙麻黄。

3.2 风热咳嗽

治宜祛风清热,止咳化痰。方药:杏苏散去紫苏、炒枳壳、前胡,加连翘、瓜蒌,对脾胃虚寒无实热的患牛不用瓜蒌;身热或口无津而渴者加生石膏、知母;对粪干燥、尿赤者加熟大黄、车前子。

3.3 肺虚咳嗽

补肺祛痰、降逆止咳。药方:止咳散(枇杷叶、紫苏子、杏仁、血余炭、前胡、贝母、桑白皮)加味,对肺气虚弱而引起的咳嗽,加党参、黄芪、补益肺气;咳而不爽者加桔梗;口渴加天花粉、石斛;食欲差加炒三仙、甘草。

3.4 脾虚咳嗽

补脾益肺,止咳化痰。方药:百合汤(百合、炙紫菀、党参、白术、茯苓、半夏、陈皮、五味子、款冬花、炙甘草)加味,孕牛咳嗽者,去

半夏加蜂蜜;气短者加黄芪、浮小麦;肚腹虚胀者加大腹皮、枳壳。

3.5 肾虚咳嗽

滋阴纳气,润肺止咳。方药:六味地黄汤(熟地黄、山萸肉、山药、泽泻、茯苓、丹皮)加白前、白芍、炙紫菀。对耳鼻俱凉者加附子、桂枝(孕牛不用)气血虚弱者加当归、百合、麦冬。

3.6 肺脾双虚

止咳散加白术、陈皮、山楂、莱菔子。

3.7 肺肾双虚

止咳散加附子、肉桂(孕牛不用)、白前、枳壳。

从治疗 146 例看,一般服药 2~3 剂即可痊愈。少则 1 剂、多则连服 3 剂。外感咳嗽,一般服药后 3d,症状基本消失,精神食欲好转,若咳嗽已久,大多数在服药后 3d 左右停止咳嗽。

4 典型病例

4.1 例一

岔河村委会陶家庄村组陶石平户,1 头 5 岁黄母牛 2009 年 2 月 6 日接诊,检查:体温 39.6°C,呼吸 33 次/min.、心跳 71 次/min., 精神沉郁,食欲减退,形体消瘦,身微热,咳嗽连声,鼻液粘稠,粪便干燥,眼结膜潮红,口色赤红,口渴贪饮,苔薄黄。脉象浮数,直检得知妊娠约 4 个月,诊断为风热咳嗽。

治疗:杏苏散加生石膏、熟大黄、车前草、煎汤候温喂服,每日 1 剂,同时配合西药富达 A 注射液 60ml 或咳喘无敌 40ml 肌注射,连喂 2 剂,药后 3d 咳嗽消失,但食欲仍差、喂炒三仙、陈皮、甘草 2 剂痊愈。

4.2 例二

大中村委会小村组高学贵户,1 头 6 岁黄公牛,2010 年 4 月 6 日接诊,该牛从未发现有

性表现,咳嗽已近一年,曾服桔梗片和枇杷叶(煎水服),未见好转。检查咳嗽低微,时而气喘,背微拱,精神倦怠,形体消瘦,食欲不佳,口色淡白,舌无苔,脉象虚弱,诊断为肾虚咳嗽(因肾不纳气、久病则咳)。

治疗:六味地黄汤加白前、制附子、炒三仙、煎汤喂服,每日1剂,连服2剂,同时配合盐酸林可霉素20ml肌注。如此中西并用,一星期后,病状全消,4月17日随访,该牛精神良好,皮毛光泽,体态正常。

5 体会

5.1 在临幊上,外感咳嗽明显多于内伤咳

嗽,在治疗的146例中,外感咳嗽型占110例,内伤咳嗽型占36例,除治疗外,还应加强饲养管理,增强其抵御外邪的能力。

5.2 咳嗽有暂久之别,新起咳嗽多系外感病邪所致、咳嗽久者多系内伤所致。

5.3 外感咳嗽在治法上着重解表,但也应佐以清热,这样内热和外邪同时祛除;内伤咳嗽则重于补,但如有浮热,也应佐以清热之品。

5.4 《元亨疗马集·咳嗽论》中说:“五脏六腑皆令兽咳嗽、非独肺也”。所以,在临幊上应考虑到肺与其它脏腑之间的相互关系,注意到其它的兼证,才不至于顾此失彼。